

Guia para Identificar e Tratar Picadas de Insetos em Gatos e Cães

	Sintomas	O que fazer	Contacte o seu Médico Veterinário em caso de:
Mosquitos 	<ul style="list-style-type: none"> · Comichão compulsiva · Inchaços inflamados 	Utilize uma compressa fria para ajudar a reduzir o inchaço.	<ul style="list-style-type: none"> · Vômitos · Convulsões · Diarreia
Abelhas 	<ul style="list-style-type: none"> · Comportamento agitado · Choro · Mordedura da zona da picada 	Remova cuidadosamente o ferrão usando algo fino (cartão ou unha). Lave a pele e use uma compressa de gelo.	<ul style="list-style-type: none"> · Fraqueza · Vômitos · Gengivas pálidas · Dificuldade em respirar · Múltiplas picadas
Moscas 	<ul style="list-style-type: none"> · Pequenos inchaços vermelhos e inflamados 	Lave a pele e use uma compressa fria para reduzir o inchaço.	Picadas que não melhoram e que estão a ficar pior.
Formigas 	<ul style="list-style-type: none"> · Semelhante à picada de mosquito mas mais pequena · Normalmente, presente nas patas 	Lave a pele e aplique gelo ou uma compressa fria.	<ul style="list-style-type: none"> · Vômitos · Convulsões · Diarreia
Aranhas 	<ul style="list-style-type: none"> · Inchaços inflamados ou vermelhidão <p>Se as bolhas estiverem rodeadas por círculos vermelhos, a picada pode ser de aranhas venenosas.</p>	No caso de aranhas venenosas, deve contactar o seu Médico Veterinário imediatamente.	<ul style="list-style-type: none"> · Salivação excessiva · Vômitos · Dores musculares
Carraças 	Normalmente presente nas patas, axilas, cabeça ou dedos.	Use uma pinça ou um kit de remoção de carraças para remover a carraça. Faça-o lentamente, garantindo que a cabeça da carraça não seja separada do corpo.	A carraça está fixada há mais de 24 horas ou em caso de febre, baixa energia, sonolência ou perda de apetite.